

# Örtüaltı ve açık alan sebzeleri

(domates,biber,patlican vb.)

## Uygulama önerileri



AMAÇ	TAVSİYE	ZAMAN
Kök oluşumu ve gelişmesi	<b>Aminosol® PS</b> Dikimden önce fideleri %5 lik çözelti ye daldırın veya 500-1000cc /da damlama uygulaması	Yeni dikim öncesi veya fideler şaşırtıldıktan 7-10 gün sonra
İlk gelişim çiçek kalitesi ve fosfor ihtiyacını karşılama	1-2 kez 500 cc /da <b>Saryel®Nutriplant 6-12-6</b>	Yeterli yaprak büyüklüğüne ulaştığında
Yaprak kalitesi ,yaprak rengi fotosentez hızlı gelişim	1-2 kez 500-1000cc /da <b>Saryel® Nutriplant N36</b>	Bitkide yeterli yaprak oluşuktan sonra
Çiçek kalitesi düzenli gelişim	3-4 kez 200cc /da <b>Saryel®ZinkS<sup>150</sup></b>	Çiçeklenme döneminden tepe kırma dönemimine kadar
Çiçeklenme, polen kalitesi , salkım dayanımı, meyve oluşumu	3-4 kez 150cc /da <b>Saryel® Bor</b>	Çiçeklenme döneminden tepe kırma dönemimine kadar
Çiçek burnu çürüklüğü ,salkım ve meyve dayanımı, kalsiyum ihtiyacını karşılama	3-4 kez 200 cc /da <b>Saryel®Robustus</b>	Meyve oluşumundan itibaren,
Çiçek burnu çürüklüğü ,salkım ve meyve dayanımı, kalsiyum ihtiyacını karşılama ,	3-4 kez 200 -300cc /da <b>Saryel®Kalsiyim-forte</b>	Meyve oluşumundan itibaren
düzenli çiçek oluşumu ve düzenli gelişim	3-5 kez 2 lt /da <b>Saryel®Nutriplant 8-8-6</b>	Çiçeklenme başlangıcından itibaren
Meyve kalitesi , ağırlık ve hacim artışı kaliteli hasat	2-3 kez 2lt /da <b>Saryel®Potasyum<sup>500</sup></b>	Meyve oluşumundan itibaren
Meyve kalitesi , ağırlık ve hacim artışı kaliteli hasat	2-3 kez 2 lt /da <b>Saryel®Kalium TS<sup>340</sup></b>	Meyve oluşumundan itibaren
Stres etkisini minimuma indirmek	200-300cc /da <b>Aminosol® PS</b>	Stres durumlarında
Toprak düzenleyici ve pH düşürücü	1-2 kez 1 lt/da <b>Saryel®Schwefel<sup>760</sup>-forte</b>	Vejetasyon süresi boyunca