

# Sofralık ve şaraplık üzüm

## Uygulama önerileri



AMAÇ	TAVSİYE	ZAMAN
Dolgun ve homojen uyanma, soğuğa karşı mukavemet	<b>TOKYO- PS 200 CC/100 L su</b>	tomurcuk başlangıç döneminden çiçek dökme dönemine kadar.
Toprak ıslahı, pH'nın dengelenmesi, ferrodoksin oluşumu	<b>NİTROPLANT 2-4 L/da</b> (damlamadan uygulanacak)	Uyanma dönemi toprak uygulaması
Vejetatif aksamı geliştirme, metabolizmayı düzenleme,Azot ve amin ihtiyacını karşılama	<b>Saryel® Nitroplant N 300 cc/100 L</b> <b>TOKYO-PS 200 cc/100 L</b>	Yaprak açma dönemi
Salkım gelişimini teşvik etme ,sıcak-soğuk stresine mukavemet .Bakır, Mangan ,Çinko, Demir,Bor ihtiyacını karşılama	<b>Saryel®STİMLUS 6-6-6 250 cc/100 L su</b> <b>Saryel®MİX 100 – 150 Gr/ 100 L su</b>	Sürgünler 15cm-25 cm iken
(SULTANI ÇEKİRDEKSİZ İÇİN)	1. Uygulama	Salkım uzatma ve pançaklanma dönemi
Salkım uzatmak ,salkım hacmini genişletmek,	<b>TOKYO-PS 200-250 cc/100 L su</b> 2. uygulama	Sultani çekirdeksiz'de 3-6 cm iken
Maximum verim ,kalite	<b>Saryel®ZinkS 200-250 cc/100 L su</b> <b>TOKYO- PS 200 cc/100 L su</b>	5 gün arayla 2 uygulama
Metabolizmayı düzenleme ,bor ihtiyacını karşılama	<b>Saryel®Bor 150-200 cc/100 L su</b> <b>Saryel®TECT-LİQUİDE 300-350 cc/100 L su</b>	Çiçeklenme öncesi.çiçek goncaları oluştuğu zaman
Sağlıklı iri ve yüksek kalitede dane gelişimi	<b>Saryel®Nitroplant N 200 cc/100 L su</b> <b>Saryel®TECT-LİQUİDE 250 cc/ 100 L su</b> <b>Saryel®ZinkS 150 cc/ 100 L su</b>	Daneler saçma iriliğinde iken
Şıralık çeşitlerde sıra kalitesinin artırılması ,meyve renk ve kalitesinin artırılması	<b>Saryel®Potasyum 350 cc/100 L su</b>	Çiçeklenme öncesi – meyve oluşum başlangıcından,olgunlaşmasına kadar.
Demir ihtiyacı karşılama	<b>SARYEL-FERUS 4.8 EDDHA %6 Fe</b> <b>500-1000 Gr/da</b>	Sulama ile birlikte damlamadan